

Estudio de una muestra de pacientes con Angioedema histaminérgico o Angioedema adquirido histaminérgico idiopático (IH-AAE)

Roberto Méndez Infante, Isidro Liarte Ruano, Aritza Seguro Azkarate, Yolanda Seras Miera, María Dolores Martínez Antón, Begoña Irazabal Diez

Hospital Universitario de Cruces (Vizcaya)

Análisis retrospectivo de las características de una muestra de pacientes con angioedema recurrente idiopático o histaminérgico con la finalidad de encontrar un patrón o patrones clínicos.

Método

- **Selección:**
- Pacientes con más de tres episodios de angioedema, con niveles de C3 y C4 normales y respondedores al tratamiento de antihistamínicos* como tratamiento de base.
- Se han seleccionado las historias con pacientes diagnosticados de angioedema sin urticaria, en los últimos 20 años.
- **Estudio básico:**
- Con historia clínica sugerente prick a una batería de alimentos.
- Analítica: determinación de C3 y C4. En algunos casos se añade determinación inhC1 (cantidad y función), C1q. En dos casos estudio mutación F-XII.
- Se recogen los datos de: sexo, edad de inicio, tiempo de evolución hasta la 1ª consulta, localización del angioedema, duración del episodio y frecuencia de los episodios.

Resultados

- Total: 68 pacientes.
- Predomina en el sexo femenino.
- Edad más frecuente de inicio. 42 años.
- El angioedema se inicia generalmente de madrugada.
- Localización más frecuente: los labios.
- Generalmente es asimétrico.
- Duración del episodio más frecuente. 48 horas.
- Frecuencia: Cada 15 días.

Discusión

Así como hay mucha literatura sobre el Angioedema Hereditario, el Angioedema bradicinérgico, encontrado poca bibliografía sobre el angioedema histaminérgico y pobre caracterización de los pacientes que lo padecen.