



# ANAFILAXIA INFANTIL

Elena Santolaya Torrego  
Servicio de Alergología e Inmunología Clínica  
Hospital Santiago Apóstol  
Vitoria



- El objetivo es revisar los casos de anafilaxia infantil estudiados en nuestro Servicio entre 2000 y 2008.
- Se trata de un estudio transversal descriptivo considerando la historia clínica del paciente y el estudio alérgico.
- Se describen 28 casos encontrados en niños de 0 a 14 años.

# Anafilaxia Infantil

## Hospital Santiago Apóstol

### Vitoria



**28 casos**

Edad media: 4,7a

50% < 3a

Predominio masculino (2:1)


6 leve

18 moderado


4 grave



# Causas




# Causas alimentos






# Causas fármacos






# Manifestaciones clínicas



# Causas por edades





- El 50% de los pacientes son menores de 3 años, existiendo un predominio masculino.
- En un 7% de los pacientes la anafilaxia tiene una evolución bifásica.
- La causa más común son los alimentos seguida de los fármacos.
- El 54% de los pacientes presenta otras sensibilizaciones alimentarias añadidas.



- En un 64% de los casos la anafilaxia es la primera manifestación de la alergia.
- La hipersensibilidad a látex es la causa en un niño de 4 años con el antecedente de 7 intervenciones quirúrgicas.
- Existen antecedentes personales de asma y dermatitis atópica en un 32% y 29% de los niños respectivamente



- La anafilaxia es una urgencia pediátrica cuyo diagnóstico y temprano tratamiento es esencial en cuanto a la reducción de la morbi-mortalidad infantil.
- La principal etiología de anafilaxia en los niños son los alimentos, siendo los de origen vegetal los más frecuentes.
- La mayoría de los niños presenta manifestaciones cutáneas y, en aproximadamente la mitad de los casos se observan síntomas respiratorios y gastrointestinales.

Muchas gracias

